



Zolpidem Tartrate Tablets

—學名藥生體相等性試驗指導原則

第一版

中 華 民 國 1 0 9 年 0 6 月 2 0 日

財團法人醫藥品查驗中心 著

本指引提供執行生體相等性試驗之相關建議。亦代表醫藥品查驗中心 (Center for Drug Evaluation, CDE) 對此議題的當前想法，並非政府機關所發佈之法規。凡涉及政策方向及法規解釋與適用，仍應依衛生主管機關之指示為準。

若對此指導原則有任何疑問，歡迎來信寄至電郵 feedbackbox@cde.org.tw

- 劑型/投與途徑:速放錠劑/口服
- 建議試驗數目: 1

(1)

類型:	空腹禁食
試驗設計:	單一劑量、隨機、雙向交叉
單位含量:	10 mg
受試者:	健康男性與女性受試者
其它建議事項:	如受試者在試驗結束後出現嗜睡或頭昏的狀況，離開試驗場所時應避免開車或騎車

- 分析標的物
 - 分析基質: 血漿
 - 分析物: Zolpidem
- 生體相等性評估
 - 藥物動力學參數: C_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$
 - 生體相等性的 90% 信賴區間範圍: 80.00-125.00% *
 - 須計算 90% 信賴區間範圍結果之分析物: Zolpidem
 - 其它建議事項: 無
- 免除生體相等性試驗要求: 不適用
- 剝半與未剝半產品的溶離曲線比對試驗:

依據原廠藥品仿單，部分使用族群建議的起始劑量為 5 mg，故臨床上會有剝半使用之狀況，因此申請者須提供剝半與未剝半產品於模擬腸胃道 pH 值 (例如：0.1 N HCl、pH 4.5 buffer、pH 6.8 buffer)、以及 QC 媒液條件下的溶離率曲線比對試驗資料(N=12)。
- 酒精誘導的體外溶離曲線傾釋試驗: 不適用

*若欲申請放寬 C_{max} 的 90% 信賴區間範圍至 75.00-133.00%，藥品必須具個體內高變異性(high intra-subject variability)且非屬療效濃度範圍狹窄。若欲證明藥品具個體內高變異性，須經由

生體相等性的主試驗 (pivotal study) 結果來進一步證實，且試驗必須為對照藥品重複交叉試驗設計 (reference replicated crossover design)，文獻結果僅能作為支持性證據。若試驗測得對照藥品的個體內變異性超過 30% 時， C_{max} 的 90% 信賴區間範圍可放寬至 75.00-133.00%，但當個體內變異性未超過 30% 時，其 C_{max} 90% 信賴區間仍應以 80.00-125.00%。上述統計方式應在試驗前詳細載明於計畫書中。

版本	發布日期	備註
第一版	2020/06/20	